

Инструкция
по применению Регидрата для профилактики и ранней терапии острых
желудочно-кишечных заболеваний инфекционной этиологии у новорожденных
телят
(Организация-разработчик: ООО Фирма «БиоХимФарм», Владимирская
область, г. Радужный)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Регидрат (Rehydrat).

Международное непатентованное название: натрий хлористый, аскорбиновая кислота, глюкоза, поливинилпирролидон, аминокусусная кислота.

2. Регидрат — комбинированное лекарственное средство в форме порошка и гранул, содержащее в одной комплект-упаковке в качестве действующих веществ — натрий хлористый 50 г, аскорбиновую кислоту 5 г, глюкозу 200 г, поливинилпирролидон — 200 г, аминокусусную кислоту 30 г, а в качестве вспомогательных веществ — калий хлористый, кальций молочнокислый или кальций уксуснокислый.

Компоненты Регидрата по внешнему виду представляет собой:

- содержимое пакета № 1 (поливинилпирролидон) — порошок белого или слегка желтого цвета;
- содержимое пакета № 2 (глюкоза) — порошок или гранулы белого или слегка желтоватого цвета;
- содержимое пакета № 3 (калий хлористый, натрий хлористый, кислота аминокусусная, кальций молочнокислый или уксуснокислый, кислота аскорбиновая) — порошок белого или светло-желтого цвета.

3. Регидрат выпускают расфасованным в комплект-упаковку общей массой 497 г, в состав которой входят три полиэтиленовых пакета : пакет № 1 — 200 г; пакет № 2 — 200 г; пакет № 3 — 97 г.

В каждый пакет вкладывают этикетку с обозначением номера пакета и названия компонента(ов).

За единицу фасовки принимают комплект-упаковку, которую маркируют с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака; лекарственной формы; названия лекарственного средства; названия и содержания действующих веществ; номера серии; даты изготовления; массы нетто; номера государственной регистрации; срока годности, штрихового кода; надписей «Для ветеринарного применения», способа применения; информации о сертификации; условий хранения; обозначения настоящего стандарта и снабжают инструкцией по применению.

Срок годности Регидрата при соблюдении условий хранения — 2 года с даты производства. Запрещается использовать Регидрат после окончания срока годности.

4. Хранят Регидрат в сухом, защищенном от света месте при температуре от 5°C до 30°C.

5. Лекарственное средство следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с законодательством.

II. Фармакологические свойства

7. Фармакотерапевтическая группа: регидратирующее средство для перорального

приема. Регидрат способствует удалению токсинов из желудочно-кишечного тракта, предупреждает образование в сычуге казеиновых бозоаров, нормализует водно-солевой баланс, стимулирует пищеварение, а также повышает общую резистентность организма.

По степени воздействия на организм Регидрат относится к малоопасным веществам (4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах и концентрациях не оказывает раздражающего и сенсибилизирующего действия.

III. Порядок применения

8. Регидрат назначают новорожденным телятам для профилактики и ранней терапии острых желудочно-кишечных болезней неинфекционной этиологии.

9. Противопоказаний к применению Регидрата не установлено, за исключением возможной аллергической реакции на отдельные компоненты лекарственного средства.

10. Регидрат применяют в форме раствора. Для этого содержимое трех пакетов растворяют в 10 л горячей воды (70-80°C), перемешивание производят до полного растворения компонентов.

Приготовленный раствор Регидрата можно использовать в течение трех суток при условии хранения его при температуре не выше 15°C. Неиспользованный раствор утилизируют на общих основаниях.

С профилактической целью Регидрат задают телятам в первые после рождения 6 выпоек в течение 2 дней, при этом в каждую разовую порцию молозива добавляют по 250 мл раствора Регидрата. В зависимости от состояния теленка длительность лечения составляет 5-7 дней.

Температура раствора Регидрата перед применением должна составлять 37°C-38°C.

11. Симптомов передозировки препарата не установлено.

12. Особенности действия препарата при его первом применении не выявлено.

13. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата курс применения необходимо возобновить в предусмотренных дозировках и схеме применения.

14. Регидрат не вызывает у животных побочного действия и осложнений при применении его в соответствии с настоящей инструкцией.

15. Применение Регидрата допускает назначение других лекарственных средств.

16. Продукты животноводства при вынужденном убое во время и после применения Регидрата используют без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Регидратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды.

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

19. При возникновении аллергических реакций в следствие контакта с Регидратом следует обратиться в медицинское учреждение.